


B r t e



POACEAE (GRAMINEAE) Festuceae  
*Bromus tectorum* L.  
Brte

cheatgrass, downy brome

**FORM:** Erect annual with fibrous, nonrhizomatous roots, 30-60cm (1-2ft) tall, with a single hollow culm. Plant turns reddish-brown following flowering.

**LEAVES:** Blades mostly 2-4mm broad with a blunt tip, sheaths closed, blades and sheaths pubescent; auricles lacking; ligules jagged (1), 1-3mm long.

**INFLORESCENCE:** Large, somewhat compact, often drooping, purple-tinged panicle 5-15cm (2-6in) long; several large spikelets per slender branch, with several florets per spikelet; lemmas have soft awns (2), rarely bent, 10-15mm long; April-June.

**HABITAT:** Introduced species, readily invades disturbed sites.

3	Syal h. t.	Pipio
	Phma h. t.	
	Caru h. t.	Psmc
	Aruv h. t.	
7	Phma h. t.	Psmc
	Sms t h. t.	
	Phma h. t.	Abgr
	Cooc h. t.	
	Libo h. t.	
	Xete h. t.	
	Asca h. t.	
	Tabr h. t.	Abgr
	Mefe h. t.	
	Setr h. t.	Abgr
	Phma h. t.	
	Clun h. t.	
	Tabr h. t.	
	Mefe h. t.	
	Xete h. t.	Abgr
+	Vagl h. t.	
	Cooc h. t.	
	Clun h. t.	Thp
	Tabr h. t.	
	Mefe h. t.	
	Xete h. t.	
	Asca h. t.	
1	Tabr h. t.	Thp
	Mefe h. t.	
	Gydr n. t.	Thp
	Adpe h. t.	
	Adpe h. t.	
	Atfi h. t.	
	Opho h. t.	
	Clun h. t.	Tshe
	Arnu h. t.	
	Mefe h. t.	
	Xete h. t.	
	Asca h. t.	
	Arnu h. t.	Tshe
	Mefe h. t.	
	Gydr h. t.	
	Mefe h. t.	Tsmc
	Xete h. t.	
	Xete h. t.	
	Luhi h. t.	
	Mefe h. t.	
	Luhi h. t.	Tsmc
	Vagl h. t.	
	Luhi h. t.	
	Clun h. t.	Abja
	Mefe h. t.	
	Xete h. t.	
	Cooc h. t.	
	Xete h. t.	
	Vasc h. t.	Abja
	Luhi h. t.	
	Mefe h. t.	Abja
	Lica h. t.	
	Caca h. t.	
	Vaca h. t.	
	Legl h. t.	
	Cooc h. t.	Abja
	Vagl h. t.	
	Vasc h. t.	
	Luhi h. t.	
	Vasc h. t.	Pico
	Xete c. t.	
	Vaca c. t.	